

CISTICERCOSI

[Reg (UE) 2019/627 art 30]



RILIEVI ANATOMO PATOLOGICI

Patologia causata da *Taenia saginata*. Il bovino è ospite intermedio, si infesta per ingestione di alimenti contaminati con le uova presenti nelle feci umane infette (l'uomo è l'ospite definitivo). Successivamente il parassita attraverso il torrente ematico raggiunge la muscolatura scheletrica dove si incista.

In sede di macellazione le cisti si rilevano a livello di miocardio, masseteri, lingua e diaframma. Hanno colorazione biancastra e misurano circa 0,5 cm

GIUDIZIO ISPETTIVO

Ispezione accurata e relativa incisione dei muscoli striati della carcassa, in particolare cuore, masseteri, pilastri del diaframma, lingua ed esofago.

Nel caso si rilevi un'infestazione localizzata: scartare e smaltire la parte coinvolta come SOA 2, eseguire un trattamento di bonifica a freddo sulle parti restanti della carcassa (-10°C per almeno 10 giorni) ([EFSA-Q-2004-002](#)).

Nel caso si rilevi un'infestazione generalizzata: distruzione della carcassa e dei visceri e smaltimento come SOA 2

Invio ICA di ritorno ad OSA ed Autorità locale competenti per allevamento di origine.

Prelievo di un campione di porzione muscolare interessata ed invio al laboratorio (IZS) per tipizzazione della specie parassitaria (PCR e sequenziamento).

