

CONTAMINAZIONE DELLE CARNI

[Reg UE 2019/627 art 45 lett o]



RILIEVI ANATOMO PATOLOGICI

Patologie tipiche degli animali anziani che riconoscono diverse eziologie e con differenti quadri anatomopatologici.

La neoplasia di più frequente riscontro nel bovino anziano è il mesotelioma che si manifesta generalmente con un ispessimento della pleura, uniforme o sotto forma di noduli e placche isolati o agglomerati, che assume colorazioni che vanno dal bianco lardaceo al roseo-giallastro o rosso

Alterazioni di consistenza, colore, forma del parenchima di qualsiasi organo e che non sono riconducibili ad alcuna patologia specifica, possono far sospettare una neoplasia



GIUDIZIO ISPETTIVO

Isolare la carcassa e le frattaglie dalla linea di macellazione per eseguire un'ispezione approfondita seguita da palpazione e incisione di visceri e linfonodi

In caso di **lesione localizzata**, procedere al prelievo di campioni da inviare all'IZS per analisi istologica. La carcassa e i visceri sono posti in vincolo sino alla ricezione dell'esito degli esami

In caso di **lesione generalizzata**, procedere al prelievo di campioni da inviare all'IZS per analisi istologica. La carcassa e i visceri, se non vengono distrutti come SOA 2 dopo il campionamento, sono posti in vincolo sino alla ricezione dell'esito degli esami e SOA 2

Considerare l'invio di ICA di ritorno all'allevamento di origine e all'Autorità competente

