



RILIEVI ANATOMO PATOLOGICI

Degenerazione a carattere proliferativo che può riguardare uno o più organi ed i relativi linfonodi.

La parte interessata perde le proprie caratteristiche anatomiche specifiche con alterazioni che possono riguardare singolarmente o in maniera congiunta la forma, il colore e la consistenza.

GIUDIZIO ISPETTIVO

Appartare la carcassa e i relativi visceri

- Ispezione, palpazione e incisione di tutti gli organi toracici/addominali;
- Ispezione palpazione e incisione dei relativi linfonodi, compresi quelli ancora adesi alla carcassa;
- Ispezione della carcassa

In caso di **presenza** di processi proliferativi a livello di altri organi/linfonodi, tali da deporre per una diffusione metastatica, esclusione diretta dal consumo umano dell'intera carcassa, comprese le frattaglie

In caso di **assenza** di processi proliferativi a livello di altri organi/linfonodi, trattenere la carcassa e le relative frattaglie presso lo stabilimento fino all'esito dell'esame istologico. In caso di impossibilità a trattenere le carni presso lo stabilimento esclusione diretta delle stesse dal consumo umano

Smaltimento parti rimosse come SOA di Categoria 2.

Indipendentemente dal grado di diffusione, prelevare sempre un campione di organi/linfonodi interessati ed invio al laboratorio con richiesta:

ESAME ISTOLOGICO

Invio ICA di ritorno ad OSA ed Autorità locale competenti per allevamento di origine.

