

PERITONITE

Reg (UE) 2019/627 art 45 lett f,o]



RILIEVI ANATOMO PATOLOGICI

Patologia causata da processi infettivi, infestazioni parassitarie e dall'azione flogogena di sostanze chimiche (urina, bile, succo pancreatico o iniettate a scopo terapeutico). Dal punto di vista eziologico si distinguono in: primitive, secondarie, ematogene, per estensione, traumatiche.

Nelle forme acute il peritoneo presenta una colorazione rossastra diffusa.

Nelle forme croniche sono presenti aderenze fibrinose e fibrose bianco-giallastre o grigiastre.

GIUDIZIO ISPETTIVO

Ispezione della carcassa e dei visceri addominali, compresi i relativi linfonodi satellite

In caso di reazione infiammatoria lieve con assenza di altre lesioni o processi infiammatori acuti a carico di altri organi e in caso di peritonite cronica, se non sono presenti lesioni che possano indicare una generalizzazione del processo, la carcassa può essere destinata al libero consumo dopo adeguata toelettatura per rimuovere la porzione di peritoneo interessata

Il solo rilievo di peritonite cronica che sia associato a "carni maleodoranti", l'intera carcassa, comprese le frattaglie sono smaltite come SOA 2

In caso di peritonite acuta con reazione infiammatoria estesa e presenza di processi infiammatori/proliferativi acuti a livello di organi/linfonodi, esclusione dal consumo umano dell'intera carcassa, comprese le frattaglie e smaltimento come SOA 2

