

PERITONITE

Reg. (UE) 2019/627 – Art. 45, lett. f)] - [9CFR 311.16(a)1]



RILIEVI ANATOMO PATOLOGICI

Presenza di lesioni infiammatorie a diverso stadio, possibile presenza di zone di aderenza

Presenza di versamento siero-emorragico nel contenitore per la raccolta dei visceri.

La milza può presentarsi aumentata di volume di colore scuro, consistenza friabile, possibile incarcerazione della stessa nel peritoneo.

GIUDIZIO ISPETTIVO

Appartare la carcassa e i relativi visceri

Ispezione della carcassa con palpazione ed eventuale incisione e dei visceri toracici e addominali compresi i relativi linfonodi satellite:

- In caso di reazione infiammatoria lieve con **assenza** di processi reattivi, a livello di altri organi/linfonodi, tali da escludere uno stato di setticemia, rimuovere la porzione di peritoneo interessata
- In caso di reazione infiammatoria estesa e/o con **presenza** di processi reattivi a livello di altri organi/linfonodi, tali da deporre per uno stato di setticemia, esclusione dal consumo umano dell'intera carcassa, comprese le frattaglie



Smaltimento come SOA di Categoria 2

[1-2-3-4] Fonte: Immagini archivio Azienda USL ModenaA