

# SINDROME DERMATITE NEFRITE

Reg. (UE) 2019/627 – Art. 45, lett. f) – o)] - [9CFR 311.22]

## Agente eziologico:

- Circovirus tipo 2 (PCV2)



## RILIEVI ANATOMO PATOLOGICI

Lesioni necrotico emorragiche a livello della cute, solitamente più visibile a livello degli arti posteriori e dei fianchi. Possibile presenza di lesioni emorragie petecchiali a livello renale.

Linfonodi aumentati di volume ed emorragici

Diagnosi differenziale: a livello cutaneo MAL ROSSINO GENERALIZZATO (le lesioni presentano la tipica forma a losanga), PESTI SUINE (le lesioni interessano in genere le estremità e hanno aspetto più omogeneo); a livello renale con LEPTOSPIROSI (in caso di LEPTOSPIROSI le lesioni renali non sono associate a lesioni necrotico emorragiche a livello cutaneo).

## GIUDIZIO ISPETTIVO

In caso di localizzazione esclusiva a livello cutaneo, “scotennatura” della carcassa:

- In caso di **assenza** di lesioni a livello della muscolatura sottostante, la carcassa e le relative frattaglie possono essere destinate al consumo umano. Smaltimento della cute come SOA Categoria 2.
- In caso di **concomitanti** lesioni renali, esclusione della carcassa e delle relative frattaglie dal consumo umano Smaltimento come SOA di Categoria 2.

Invio ICA di ritorno ad OSA ed Autorità locale competenti per allevamento di origine.



[1-2] Fonte: Immagini archivio Azienda USL Modena