



# DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE NEL BAMBINO



**Vademecum per genitori e addetti al primo soccorso e alle emergenze nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado**

## Nel bambino cosciente

### Effettuare la manovra di Heimlich:

- Abbracciare la vita il bambino
- Con il pollice ed indice della mano comporre una C che colleghi il punto inferiore dello sterno
- All'interno della C porre l'altra mano a pugno con il pollice all'intero
- Staccare la mano che aveva disegnato la C ed afferrare il pugno
- Eseguire compressioni vigorose che abbiano una direzione dal basso verso l'alto



### Oppure effettuare la manovra delle pacche dorsali:

- Alle spalle del bambino, bloccare la testa attraverso la 'Presca della mandibola' (fare una C col pollice di una mano su una guancia e le altre dita sull'altra guancia).
- Posizionare la pancia del bambino sulla nostra coscia.
- Con l'altra mano somministrare 5 pacche forti fra le scapole con via di fuga laterale



## Alternare le due manovre

## Nel bambino non cosciente

- Deposare il paziente sul pavimento
- Aprire la mandibola
- Rimuovere solo i corpi estranei visibili
- Effettuare un tentativo di respirazione artificiale
- In caso d'insuccesso ritentare eseguendo la manovra di Heimlich
- Valutare il polso radiale e il polso carotideo (frequenza: 80-120 battiti/minuto)
- Controllare il tempo di riempimento capillare

